



ООО «Верона».
ОКПО 62803755. ОГРН 1097746528220.
ИНН 7716648010. КПП 772801001.
РФ, 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 104, эт. 1, пом. СХС, ком. 22.

☎ 8 (499) 229-99-69
🌐 www.viterramed.ru
✉ info@viterramed.ru



Лицензия на медицинскую деятельность ЛО41-01137-77/00349305 от 21 мая 2020 года.

Приложение №4

к Приказу №15/05 от 15.05.24г.

Показания, противопоказания к проведению КТ- исследований,

в том числе с контрастным усилением, а также памятка для пациентов по подготовке к исследованию

1. Противопоказания для КТ без внутривенного контрастирования

1.1. Относительные противопоказания (абсолютных – нет):

- 1.1.1. Беременность (КТ проводится по жизненным показаниям при наличии согласия пациента и (или) родственников).
- 1.1.2. Антропометрические особенности (масса тела пациента, объем живота) препятствующие проведению КТ в соответствии с рекомендациями производителя оборудования, сервисной организацией или конструктивными особенностями КТ.
- 1.1.3. Наличие металлических зубов, танталовых скобок на грудине, кава-фильтров. Вопрос о целесообразности исследования решается путем консультации с врачом-рентгенологом.
- 1.1.4. Клаустрофобия, гиперкинезы, психические заболевания при невозможности проведения седации.
- 1.1.5. Детский возраст.

2. Противопоказания для КТ с внутривенным контрастированием.

2.1. Абсолютные противопоказания:

- 2.1.1. ОПН, ХПН (скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин/1,73 м², в том числе при сахарном диабете, сердечной недостаточности, является противопоказанием к внутривенному введению контрастного препарата в АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ).
- 2.1.2. Декомпенсированный тиреотоксикоз.
- 2.1.3. Прием метформина при сахарном диабете (при скорости клубочковой фильтрации менее 50 мл/мин/1,73 м², прием сахароснижающих препаратов, содержащих метформин, необходимо отменить препарат за 24 часа до исследования и возобновить прием через 48 часов только после обязательного контроля функции почек). Отмену приема препаратов, замену на другой препарат проводит врач эндокринолог.
- 2.1.4. Аллергия на йодсодержащие препараты в анамнезе с тяжелыми аллергическими реакциями, анафилаксией, поливалентная аллергия с умеренными и тяжелыми реакциями, требовавшими медикаментозного лечения. (Выполнение предварительной пробы на

индивидуальную непереносимость контрастного вещества нецелесообразно и может быть опасным вследствие развития сенсibilизации).

2.2. Относительные противопоказания:

2.2.1. Декомпенсация основного заболевания.

2.2.2. Беременность (по жизненным показаниям при наличии согласия пациента и (или) родственников).

2.2.3. Антропометрические особенности (масса тела пациента, объем живота) препятствующие проведению КТ в соответствии с рекомендациями производителя оборудования., сервисной организацией или конструктивными особенностями КТ.

2.2.4. Наличие металлических зубов, танталовых скобок на груди, кава-фильтров. Вопрос о целесообразности исследования решается путем консультации с врачом-рентгенологом.

2.2.5. Клаустрофобия, гиперкинезы, психические заболевания при невозможности проведения седации.

2.2.6. Детский возраст.

2.2.7. Бронхиальная астма (требующая медикаментозного лечения), менее 1 года после приступа.